

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



Similac
A PARTIR DE LOS 6 MESES

Fórmula adaptada para lactantes de 6 a 24 meses con hierro, mezcla de oligosacáridos, nucleótidos, DHA y luteína.

(Denominación en el Registro Sanitario)

Similac®

A PARTIR DE LOS 6 MESES

COMPOSICIÓN

FÓRMULA CUALITATIVA

Ingredientes:

Leche descremada, lactosa, ACEITES VEGETALES (aceite de girasol alto en oleico, aceite de soya, aceite de coco), *mezcla de 5HMO's (oligosacáridos) [2'-fucosil lactosa, lacto-N-tetraosa, 3-fucosil lactosa, 6'-sialil lactosa, 3'-sialil lactosa], MINERALES (citrate de potasio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, hidróxido de potasio, cloruro de calcio, cloruro de magnesio, fosfato tricálcico, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, selenato de sodio, yoduro de potasio), VITAMINAS (vitamina C, palmitato de ascorbilo (función parcial antioxidante), vitamina E, niacinamida, d-pantotenato de calcio, vitamina A, vitamina B1, vitamina B6, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K1, d-biotina, vitamina D3, vitamina B12), ácido araquidónico (AA), lecitina de soya (emulsificante), mio-inositol, ácido docosahexaenoico (DHA), bitartrato de colina, NUCLEÓTIDOS (5'-monofosfato de citidina, 5'-monofosfato de guanosina disódica, 5'-monofosfato de uridina disódica, 5'-monofosfato de adenosina), cloruro de colina, taurina, Bidobacterium lactis, mezcla de tocoferoles (antioxidante), L-carnitina, CAROTENOIDES (luteína, β -caroteno).

Contiene ingredientes de leche y de soya.

INFORMACIÓN REGULATORIA

REGISTRO SANITARIO	A-155.997
NÚMERO CPE	CPE1222529243
CATEGORÍA DEL REGISTRO	Fórmula infantil
VIGENCIA	29/09/2027
TITULAR	Abbott Ireland
FABRICANTE	Abbott Ireland
IMPORTADOR	Casa de Representación Grupo Supplypharma, C.A
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	24 meses
MATERIAL DE ENVASE	LATA: Cuerpo de aluminio ó acero - Cierre de acero ó aluminio. Sobretapa plástica de PEBD.
PRESENTACIONES COMERCIALES	Lata x 350 g

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

SIMILAC® A PARTIR DE LOS 6 MESES	EAN 13	EAN 14
SIMILAC® A PARTIR DE LOS 6 MESES LATA X 350G	5099864017304	15099864017301

PRECAUCIONES

- No administrar por vía parenteral
- No usar en galactosemia

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

- Uso oral

INFORMACIÓN DE CALIDAD

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

LATA: Almacene la lata sin abrir a temperatura ambiente. Una vez abierta la lata, el contenido debe usarse dentro de las tres semanas siguientes. Tape la lata y almacénela en un lugar fresco y seco (no en el refrigerador).

DATOS DE CONTACTO

Importado y distribuido para la República Bolivariana de Venezuela por Casa de Representación Grupo Supplypharma, C.A. RIF J41078404-0

DECLARACIÓN DE CALIDAD

El producto se fabrica en un sitio de manufactura soportado por un sólido sistema de aseguramiento de calidad en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios establecidos por las autoridades sanitarias del país de origen y de las regulaciones locales aplicables. El sitio de manufactura cuenta con certificaciones de calidad e inocuidad que cumplen los más altos estándares internacionales. El producto se encuentra incluido dentro del programa de vigilancia post mercadeo de la compañía.

AVISO IMPORTANTE

La leche materna es el mejor alimento para los niños y niñas lactantes hasta los dos años de edad. Debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida para lograr todos los beneficios nutricionales e inmunológicos del lactante menor. Una buena alimentación de la madre es importante para la preparación y mantenimiento de la lactancia materna. Introducir alimentación parcial o total con biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna y revertir la decisión de no amamantar es difícil. Las implicaciones sociales y financieras de la alimentación con fórmula deben tenerse en cuenta cuando se decide utilizar este método de alimentación. Cualquier uso inapropiado o innecesario de las fórmulas infantiles puede conllevar a riesgo en la salud. Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene el alimento puede ser perjudicial para la salud del niño. Un profesional de la salud debe ser consultado antes de iniciar la alimentación con una fórmula infantil.